

Curenox® 50 كورينوكس

OXYCHLORURE DE CUIVRE 88% أكسيكلورور النحاس

C.H.P.P.U.A.N°

R 06 44 271

رخصة التسجيل:

CONTRE LE MILDIU DE LA VIGNE ET DE LA POMME DE TERRE

ضد ميلديو البطاطس و العنب

Poudre mouillable (WP)

مسحوق قابل للبلل (WP)



Cultiver l'avenir

Curenox® 50 كورينوكس

OXYCHLORURE DE CUIVRE 88% أكسيكلورور النحاس

Curenox 50 est un fongicide cuprique à base d'oxychlorure de cuivre agissant par contact et de façon préventive contre le mildiou de la vigne

et de la pomme de terre ainsi que les maladies bactériennes. **Curenox 50** présente aussi une action intéressante sur BRENNER et BOTRYTIS;

Curenox 50 est particulièrement intéressant sur mildiou tardif en couverture cuprique

كورينوكس مبيد فطري مركب من أكسيكلورور النحاس له فعالية وقائية ثانوية ضد العفن الرمادي (BOTRYTIS) البرينير (BRENNER) و الأمراض البكتيرية.

المقادير و الإستعمالات المسموحة:

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS:

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C	D.A.R
Vigne : Mildiou, Black-rot	3 - 4 kg/ha	
Pomme de terre : Mildiou	3 - 4 kg/ha	
Tomate : Mildiou, Alternariose	3 - 4 kg/ha	7 jours
Arbres fruitiers : Bactériose	0,3 - 0,4 kg/hl (En traitement d'hiver)	
Cultures légumières : Bactériose	0,40 kg/hl	

فترة ما قبل الجني	الجرعة	فئة الإستعمال
	3 - 4 كغ/هكتار	الكروم : الميليديو، التعفن الأسود(البلاك روت)
	3 - 4 كغ/هكتار	البطاطا : الميليديو
7 أيام	3 - 4 كغ/هكتار	الطماطم : الألترناريو
	0,3 - 0,4 كغ/هكتار (العلاج الشتوي)	الأشجار المثمرة : الباكتريريوز
	0,4 كغ/هكتار	الخضروات : الباكتريريوز

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE:

Ajouter **Curenox 50** à une petite quantité d'eau de façon à obtenir un mélange homogène. Verser la préparation dans la cuve remplie à moitié et faire fonctionner l'agitateur.

Compléter le remplissage de la cuve.

Ne laisser pas la bouillie à l'intérieur du pulvérisateur pendant longtemps, l'utiliser entièrement de préférence ou, juste après sa préparation.

Pour un résultat optimal, la pulvérisation doit être uniforme.

COMPATIBILITÉ:

NE PAS MELANGER AVEC ZIRAME.

Pour tout autre mélange, procéder à un test préalable avant de généraliser le traitement.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI:

Assurer une bonne couverture de la culture traitée.

Repéter l'application si nécessaire, particulièrement après de fortes pluies.

تحضير السائل:

أضف **كورينوكس** إلى كمية قليلة من الماء بحيث يكون الخليط متلاحم. كب التحضير في الخزان الذي يكون مملوء إلى نصفه ثم واصل تعبئة الخزان.

إمكانيات الخلط:

يُمنع الخلط مع مادة الزيرام. يُستحسن القيام باختبار قبل تعميم إستعمال الخليط

تعليمات الإستعمال:

يجب تغطية جيدة للنبات المعالج، خاصة بعد هطول امطار غزيرة. إعادة المعالجة إذا إستلزم الامر،

Distribué par:
Agro Consulting International
194 Rue Boudjémâa KHELIL
Oued Romane CP 16403
El-Achour Alger
021 30.78.04 / 021 30.83.39
021 30.02.08 / 021 30.70.34
021 30.81.63 à 66
Fax: 021 30.83.66
Web: www.aci-algerie.com



IQV
Av. Rafael Casanova, 81
(Barcelona) España
Tel. 34 93 579 66 77
Fax. 34 93 579 17 22
E-mail: iqv@iqvagro.com

مستورد و موزع من طرف : شركة أقرو كونسولتينج الدولية
194 , شارع بوجمعة خليل. واد الرمان 16403 العاشور الجزائر.

Cultiver l'avenir

إكو في . س .أ. نهج رفائيل كازانوف، 81 برشلونا، إسبانيا