

مورفوس
720 SC

مبيد فطري ذو تأثير بالملامسة
على الميديدو والألترناريا

التركيب

يحتوي مورفوس على 720 غ/ل من المادة الفعالة كلوروثالونيل على شكل مركز معلق.

نطاق الاستعمال

يوفر مورفوس حماية وقائية عالية على العديد من الأمراض كالميديدو والألترناريا في العديد من المزروعات (الخضراوات، البطاطا، الكروم والتبغ).

طريقة التأثير

مورفوس مبيد فطريات وقائي، لا يكتسب أي مفعول علاجي لذا يجب استعماله قبل الإصابة لحماية المزروعات. يفضل طريقة تأثيره، أي متعدد مواقع التأثير على الفطر، فخطر ظهور مقاومة الفطريات ضعيف.



Doses d'utilisation

Cultures	Maladies	Doses	Délai avant récolte
Vigne	Mildiou	2 L/ha	14 jours
Cultures maraichères	Mildiou, Anthracnose	2 L/ha	7 jours
Tomate	Mildiou, Alternaria	2 L/ha	7 jours
Pomme de terre	Mildiou, Alternaria	2 L/ha	21 jours

المقادير و الاستعمالات

قوة ما قبل الحني	المقاييس	الأمراض	الزراعات
14 يوم	2 ل / هكتار	الميديدو	الكروم
07 أيام	2 ل / هكتار	الميديدو والألترناريا	الخضراوات
07 أيام	2 ل / هكتار	الميديدو والألترناريا	الطماطم
21 يوم	2 ل / هكتار	الميديدو والألترناريا	البطاطا



Bien lire l'étiquette du produit, avant toute utilisation

يجب قراءة الإرشادات المذكورة على الالاصفة قبل استعمال المبيد و يجب احترامها بدقة

تصريح بالبيع في الجزائر رقم 06 44 090
Autorisation de vente en Algérie n° 06 44 090
Marque enregistrée et déposée par Rotam Ltd

Fabricant :
Rotam Agrochemical Co. Ltd

Contact :
Rotam Maghreb Limited
Cité 1200 logements Coop.
Granitex Bt 4 N° 3, Bab Ezzouar,
Alger, Algérie
Mob. : +213 (0) 661 54 89 29
Site : www.rotam.com

Importé par :
Agro Consulting International, ACI
194, Rue Boudjemaa Khellil,
Oued Romane, El Achour, Alger
Tél : +213 (0) 21 30 81 63 à 66
Fax : +213 (0) 21 30 83 66



Outils d'avenir



**Fongicide multi-sites
à large spectre d'action**

مبيد فطري
ذو تأثير بالملامسة



Fongicide de contact ayant un effet préventif.

Composition :

720 g/l de Chlorotalonil

Formulation :

Suspension Concentrée (SC)

Famille Chimique :

Chloronitril

Spectre d'activité :

MORFUS est très efficace pour la lutte contre le Mildiou et l'Alternaria des cultures maraîchères et la pomme de terre, le mildiou de la vigne et du tabac. Il contrôle aussi d'autres maladies sur ses mêmes cultures à savoir le Cladosporiose et l'Anthracnose.

Mode d'action :

MORFUS est un fongicide de contact pour la prévention des maladies fongiques.

C'est un puissant inhibiteur de la germination des spores et zoospores.

MORFUS est un produit complémentaire des fongicides systémiques. Il doit être appliqué avant et après les fongicides systémiques, lorsque les conditions et les risques d'apparition du mildiou sont favorables.

Grâce à son effet multi sites, le risque d'apparition du phénomène de résistance est très faible.

Chlorothalonil n'est pas systémique et ne se déplace pas du site d'application vers d'autres parties de la plante, ainsi une bonne application de **Morfus** implique un contrôle efficace et persistant.

MORFUS n'est pas absorbé par les racines.

Recommandations d'utilisation :

- Traiter en préventif dès que les risques sont présents.
- Traiter tous les 7 jours en période humide ou pluvieuse (hiver-automne) et en cas d'irrigation par aspersion.
- Traiter tous les 10 jours en période sèche (printemps et été) et en cas d'irrigation goutte à goutte.

Propriétés :

- Excellent fongicide préventif.
- Large spectre d'action.
- Résistant au lessivage par les eaux de pluies et de l'irrigation.
- Après traitement, il se colle et demeure sur les feuilles.
- Anti lessivant par excellence.
- Faible risque de résistance grâce à son mode d'action multi sites.
- Partenaire des programmes de management de la résistance aux fongicides.
- Améliore le rendement en qualité et quantité.
- Induit un excellent retour de l'investissement pour l'agriculture.
- Bénéfices majeurs pour l'agriculteur.

Compatibilité :

MORFUS est compatible avec la plupart des fongicides et insecticides possédant une formulation poudre mouillable ou granulés dispersibles.

Il faut être sûr de tous mélanges avant application.

Ne pas mélanger avec les produits possédant une formulation Emulsion Concentré (EC).



كيفية الإستعمال
يجب التدخل وقتياً كلما توفرت الشروط لحدوث المرض. لحماية جيدة، عالج كل 7 أيام في فترة رطبة أو ممطرة (شتاء و خريف) وفي حالة السقي بالرش. عالج كل 10 أيام في المرحلة الجافة (ربيع و صيف) و في حالة السقي قطرة بقطرة.

التسليم
يتلاءم مورفوس مع معظم المبيدات الحشرية و المبيدات الفطرية على شكل مسحوق أو حبيبات قابلة للتبليل. يوصى القيام بتجربة قبل تعميم العلاج. لا ينبغي خلط مورفوس مع المبيدات على شكل مركز قابل للاستحلاب.

