



C.H.P.P.U.A N° : N° 07 45 114 : رخصة بيع رقم

ريفاكول 70 RIVACOL 70

Matière active

70% PROPINEBE

70 % برويناب

المادة الفعالة

Groupe Chimique

Carbamates (Dithiocarbamates).

كاربامات (ديثيوكاربامات)

العائلة الكيميائية

Mode d'action

contact à action préventive rapide

باللمس، وقائي سريع المفعول

طريقة التأثير

PROPRIETES :

RIVACOL 70 Est un fongicide sur multicultures, doté d'une action préventive rapide et efficace sur plusieurs champignons pathogènes. Une fois pulvérisé **RIVACOL 70** constitue un film protecteur sur la plante, ce qui permet une excellente couverture phytosanitaire même après une pluie.

RIVACOL 70 possède une longue rémanence dans le sol.

RIVACOL 70 respecte les abeilles et la faune auxiliaire

RIVACOL 70 est également doté d'une action secondaire sur les acariens.

المميزات :

ريفاكول 70 مبيد فطري يعمل بالوقاية ضد عدد كبير من الفطريات الضارة .

يعمل ريفاكول 70 كغشاء على الأوراق مما يسمح للنبات بالحصول على مقاومة أكبر حتى بعد سقوط الأمطار.

ريفاكول 70 له تأثير طويل الامد في التربة.

ريفاكول 70 غير ضار للنحل و الحشرات النافعة.

له فعالية ثانوية على العناكب.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE:

Mélanger progressivement **RIVACOL 70** à une petite quantité d'eau de façon à obtenir un mélange homogène. Verser la préparation dans la cuve remplie à moitié et faire fonctionner l'agitateur. Compléter le remplissage de la cuve. Eviter de projeter la poudre directement à la surface de l'eau.

Ne pas laisser la bouillie pendant longtemps à l'intérieur du pulvérisateur, l'utiliser entièrement de préférence ou, juste après sa préparation. Pour un résultat optimal, la pulvérisation doit être uniforme.

تحضير السائل :

لا بد من خلط المسحوق تدريجيا مع كمية قليلة جدا من الماء، لا تلقي أبدا بالمسحوق على سطح الماء. أفرغ المستحضر في الخزان المملوء إلى الربع.

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

المقادير و الإستعمالات المسموحة :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSE EN P.C	D.A.R
MILDIOU /ALTERNARIA Des cultures maraichères	200 à 250 g/hl	07 Jours
MILDIOU /ALTERNARIA De la vigne	200 à 300 g/hl	15 Jours
TAVELURE Des arbres fruitiers	200 à 250 g/hl	15 Jours

فترة ما قبل الجني	الجرعة	فئة الإستعمال
7 أيام	200 - 250 غ/هـل	ميلديو / ألترناريا الخضروات
15 يوم	200 - 300 غ/هـل	ميلديو / ألترناريا الخضروات
15 يوم	200 - 250 غ/هـل	تبقع الأشجار المثمرة

COMPATIBILITÉ :

RIVACOL 70 est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires et engrais foliaires.

Néanmoins, il est recommandé de procéder à un test préalable avant de généraliser le traitement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Respecter les doses d'utilisation. Porter du matériel de protection approprié.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Détruire les emballages vides et les enfouir.

Après traitement, changer de vêtements et se laver soigneusement avec de l'eau et du savon.

Nettoyer soigneusement le matériel de pulvérisation après chaque utilisation.

CONDITIONS DE STOCKAGE:

Garder sous clé hors de la portée des enfants.

Garder à l'écart des aliments et boissons y compris ceux destinés aux animaux.

Stocker uniquement dans les emballages d'origine, bien fermer, dans un endroit sec, ventilé et à l'abri de la lumière.

ANTIDOTE ET PREMIERS SOINS:

Pas d'antidote spécifique, traitement symptomatique.

Appeler immédiatement un médecin dans tous les cas d'intoxication présumée.

En cas de malaise: consulter un médecin et lui montrer l'étiquette.

Contact avec la peau: enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver à l'eau seule ou avec du savon.

En cas d'ingestion: si la personne est inconsciente, ne rien lui administrer et ne pas la faire vomir. Évacuez-la immédiatement vers le centre médical le plus proche en emportant l'étiquette.

إمكانيات الخلط :

ريفاكول 70 يمكن أن يخلط مع جميع المبيدات الزراعية بما فيها الأسمدة الورقية . في حالة الخلط مع مبيد آخر . يستحسن بالقيام بأختبار قبل تعميم إستعمال الخليط.

إحتياطات الإستعمال :

يجب قراءة بطاقة الإستعمال و احترام المقادير المسموحة.

ارتداء ملابس الوقاية كالفازات و النضارات وواقي الوجه.

يمنع إستنشاق بخار الرش عند الإستعمال.

جانب لمس الأعين أو البشرة.

بعد الإستعمال, يجب غسل الأيدي الجسم و تبديل الملابس.

عوامل التخزين :

تخزن المادة في علبتها الأصلية في مكان جاف ومغلق بعيد عن متناول الأطفال وعن المواد الغذائية بما فيها الموجهة للحيوانات.

الإسعافات الأولية :

العلاجات الأولية ونصائح الأطباء. في حالة التسمم.

- في حال ظهور اي أعراض تسمم, أذهب فورا عند الطبيب و قدم له بطاقة الإستعمال.

- في حالة لمس الجلد : نزع الملابس الملوثة فورا, ويغسل الجلد بالماء والصابون .

- في حالة لمس الأعين: أغسل العين بكثافة بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة.

- في حالة وصول الجاري إلى المعدة : إذا كان المصاب فاقد الوعي , لا يعطى أي شيء و لا يقيء. وينقل إلى أقرب مركز طبي .



ميلديو الكروم



Mildiou sur Vigne

تبقع الأشجار المثمرة



Tavelure des Arb. fruitiers

ميلديو الطماطم



Mildiou sur Tomate

Importé et distribué en Algérie par :
ACI AgroConsulting
194 Rue Boudjemâa khelil Oued Romane,
El Achour - Alger.
Tél: 021 30 81 63 à 66 Fax : 021 30 83 66
Mail : info@aci-algerie.com
Web : www.aci-algerie.com



مستورد و موزع من طرف :
شركة أفره كونسولتينج الدولية
194. شارع بوجمعي خليل.
واد البرمان العاشور الجزائر.
الهاتف : 021 30 81 63-66
الفاكس : 021 30 83 66

Fourni par :
Rivale
7 - 9 Rue Paul Lafargue
92800 Puteaux - France
Tél. : +33 (0)1 47 76 32 66
Fax : +33 (0)1 47 76 34 90
Mail : contact@rivale.fr
Web : www.rivale.fr



ممول من طرف :
شركة ريفال
9-7 شارع بول لافارق -
لا ديفانس 92800 بوتو- فرنسا