

# روم تري 480 SC

مبيد عشبي جهاززي و إختياري ذو مجال إستعمال واسع ضد معظم الأعشاب الضارة أحادية و ثنائية الفلقة.

## التركيب

يحتوي روم تري 480 SC على 480 غ/ل من مادة متريبوزين على شكل معلق. ينتمي للعائلة الكيميائية تريازينون.

## مميزاته

روم تري 480 SC بعد الإمتصاص الجذري و الورقي يؤثر على تركيب و توقف تطور الأعشاب الضارة. من أجل إنتشار جيد ينصح إستعمال روم تري 480 SC على تربة رطبة و في حالة التربة الجافة ينصح إتباع العلاج بعملية سقي خفيفة.

## تحضير الخليط

لتحضير سائل الرش، ينبغي ملء نصف الخزان بالماء، ثم إضافة الكمية اللازمة من روم تري 480 SC مع الخلط جيدا.

## التلادم

تجنب الخلط مع المبيدات القلوية و الحامضية.



## Usage Agricole:

Culture	Usages	Dose	D A R
Tomate	Mauvais herbes annuelles mono cotyledones et Dicotyledones	500 - 730 MI/Ha	21 jours

## الإستعمال الفلاحي:

فترة ما قبل الجني	المقاييس	الأفة	الزراعات
21 يوم	730 - 500 مل/هكتار	الأعشاب الضارة أحادية و ثنائية الفلقة	الطماطم

## Autres usages :

Rometri 480 SC est aussi très efficace sur les principales mauvaises herbes de la P de T, son application intervient de la plantation jusqu'à 5 % de la levée de la Culture.

Dose d'application : 1 - 1,2 L / Ha

## إستعمالات أخرى :

روم تري 480 SC فعال أيضا على معظم الأعشاب الضارة للبطاطا، يُستعمل قبل خروجها إلى 5% من طلوعها.

مقاييس الإستعمال : 1,2 - 1 ل / هكتار



بجب قراءة الإرشادات المذكورة على اللاصقة قبل إستعمال المبيد و يجب إحترامها بدقة.

Bien lire l'étiquette avant d'utiliser le produit en respectant les consignes de sécurité.

Fabriqué par : ROTAM, AGROCHEMICAL CO.,LTD  
Contact : Rotam Maghreb Limited  
Cité 1200 Iogement coop.Granitex  
Bt 4 N°3, Beb Ezzouar, Alger, Algérie.  
Tel : +213 21 24 28 48  
Fax : +213 21 24 37 29  
Site web : www.rotam.com

Importé et distribué en Algérie par : ACI AgroConsulting  
194 Rue Boudjemâa khelil Oued Romane,  
El Achour - Alger.  
Tél: 021 30 81 63 à 66 Fax : 021 30 83 66




# ROMETRI 480 SC



## مبيد عشبي جهاززي و إختياري

## Herbicide Systémique sélectif



Herbicide systémique sélectif à large spectre d'action pour le contrôle pré et post-levée de nombreuses mauvaises herbes annuelles monocotylédones et dicotylédones dans les cultures de la tomate et de la pomme de terre .

### Composition :

**Rometri 480 SC** contient 480 g/l de Metribuzine sous forme de suspension concentrée. Il appartient à la famille chimique des Triazinones.



### Caractéristiques:

Absorbé principalement par le système racinaire, mais aussi par les feuilles des mauvaises herbes, il agit sur la photosynthèse et par conséquent bloque le développement des adventices. Son spectre d'activité est large, principalement en ce qui concerne les dicotylédones, mais aussi les graminées.

Les plantules des mauvaises herbes sensibles traitées, émergent mais sont rapidement atteintes par une chlorose puis se nécrosent complètement après 2 à 5 jours.

### Préparation de la bouillie :

Adapter la quantité de bouillie aux types de cultures et au développement de la végétation. Remplir à moitié le réservoir du pulvérisateur avec de l'eau. Commencer l'agitation, ajouter la quantité mesurée de **Rometri 480 SC** sans interrompre l'agitation.

Maintenir l'agitation et remplir d'eau la cuve du pulvérisateur.

Rincer au moins 3 fois l'emballage vide en ajoutant à chaque fois cette eau de rinçage à la bouillie.

Utiliser la bouillie en totalité le jour de sa préparation.

### إحتياطات الإستعمال

- لا يجب إستنشاق المبيد.
- يجب ا لإغتسال الجيد بالصابون و الماء قبل تناول الطعام.
- تجنب ملامسة المبيد بالبشرة، العين و الملابس.
- أثناء الرش، يجب إرتداء الملابس الواقية : القفازات، النظارات...
- لا يجب رش المبيد عكس إتجاه الريح.
- إبعاد الأشخاص و الحيوانات من منطقة الرش.
- يجب تبديل الملابس يوميا في حالة تلوثها بالمبيد.
- يجب تفادي رمي بقايا الخليط في الخنادق، و لامجاري المائية.
- قم برشها على أراضي بور.
- يجب غسل العبوة الفارغة و تقبها حتى لا يعاد إستعمالها.

