

BRUMBY

80EC

مبيد الحبوب

برامبي 80 EC



مقادير الإستعمال :

يستعمل برامبي على مقدار 0.75 ل/الهكتار في بداية إنبات الزرع، من مرحلة 2-3 أوراق إلى غاية مرحلة تصفب الإشتاء ينصح باستعمال برامبي مبكرا على الفلارم (البراقة) و المدهون وعدم تجاوز مرحلة بداية الإشتاء للنجليات .

تحضير الخليط :

- إملاء 3/4 خزان جهاز الرش بالماء مع تشغيل المحرك
- إفراغ كمية برامبي اللازمة في جهاز الرش و أغسل العبوة الفارغة بالماء و أضف ماء الغسل إلى الخليط
- أكمل الملء و استمر في التحريك
- تتراوح كمية الخليط المستعملة بين 300 إلى 400 لتر ماء في الهكتار حسب العتاد المستعمل
- يجب ضبط أجهزة الرش جيدا قبل الإستعمال



رخصة البيع رقم : 08.46.118 C.H.P.P.U.A. N° :

Doses & usages :

Appliquer **BRUMBY 80 EC** à 0,75 L de PC/ha en post-levée des céréales du stade 2 à 3 feuilles jusqu'au stade mi-tallage.

Pour le ray – Grass et le Phalaris, il est recommandé de ne pas dépasser le stade début tallage des adventices.

Préparation de la bouillie :

- Remplir la cuve du pulvérisateur au ¾ d'eau et mettre l'agitateur en marche.
- Verser la dose de **BRUMBY 80 EC** dans la cuve et rincer l'emballage vide et rajouter cette eau de rinçage à la bouillie.
- Continuer le remplissage de la cuve.
- Bien régler le pulvérisateur avant l'utilisation.
- Maintenir l'agitateur en marche.
- Volume de bouillie 300 à 400 litres / ha selon le type de matériel.

Compatibilité :

BRUMBY 80 EC peut être mélangé avec de nombreux herbicides anti-dicotylédones tels que le **Granstar® 75 DF**.

Pour l'association du **BRUMBY 80 EC** avec le **Granstar® 75 DF**, il est recommandé de bien mélanger d'abord le **Granstar® 75 DF**, et ensuite rajouter le **BRUMBY 80 EC**.

Précaution d'emploi :

Lire attentivement l'étiquette sur le bidon avant utilisation du produit.



Cultiver l'avenir

BRUMBY

80EC

برامبي 80™ EC

Phalaris
(البراق)Ray grass
(الزوان المدهون)Folle avoine
(الخرطال البري)

Spectre d'activité

BRUMBY

2 à 3 feuilles
وورقتين إلى 3 أوراق

Début tallage
بداية الإشتاء

Mi tallage
نصف الإشتاء

Fin tallage
نهاية الإشتاء

Début épilaison
بداية الإسبال

برامبي مبيد عشبي جهازى لمكافحة النجيليات الحولية في محاصيل القمح الصلب و القمح اللين و التريتكال .

التركيب

مستحلب مركز يحتوي على 80% من مادة كلوديناغوب - بروبارجيل و 20% من كلوكانتوسات - مكسيل

طريقة التأثير :

يمتص برامبي بسرعة من طرف اوراق النجيليات, ثم ينقل الكلوديناغوب بروبارجيل عن طريق التسغ نحو الانسجة المرستيمية, ينتج عن ذلك توقف النجيليات الحولية الحساسة و هذا خلال 48 ساعة بعد الرش .

- تظهر اعراض الاصفرار و النخر من 1 إلى 3 أسابيع .
- يكون موت العشب الضارة خلال مدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع بعد المعالجة .

مجال الإستعمال :

يقضى برامبي على العديد من النجيليات الحولية في محاصيل القمح الصلب و اللين و التريتكال أهمها :

- الخرطال البري
- الفلارس (البراق)
- الزوان (المدهون) .

الإختيارية :

يتلائم برامبي مع كل أصناف القمح الصلب, القمح اللين و التريتكال . يمنع منعاً باتاً بإستعمال برامبي على زراعات الخرطال و الشعير .

للمزيد من المعلومات و الإرشادات يرجى الإتصال بقرقة تقية
Pour plus d'information veuillez contacter le service technique d'AGCI

Distribué par :
Agro Consulting International
194 rue boujenne Khell Oued Ramee
16403 El-Achour - Alger
Tel : 021.30.78.04 / 30.83.39 / 30.02.08 / 30.70.34 / 30.81.63 à 66
Fax : 021.30.83.66 , email : info@aci-algerie.com
Web : www.aci-algerie.com



Cultiver l'avenir

Présentation :

BRUMBY 80 EC herbicide systémique de post -levée pour lutter contre les adventices graminées annuelles dans les cultures de blé dur, blé tendre et triticales.

Composition :

BRUMBY 80 EC est un concentré émulsionnable contenant :
80 % de Clodinafop - propargyl
20 % de Cloquintocet- mexyl

Mode d'action :

BRUMBY 80 EC est absorbé par les feuilles des graminées, puis rapidement transporté par la sève dans la plante ; il s'accumule dans les tissus méristématiques, la croissance active des graminées sensibles est stoppée dans les 48 heures qui suivent l'application.

Les symptômes de décoloration et nécrose apparaissent sur les feuilles de 1 à 3 semaines.

Les adventices sont complètement détruites au bout de 4 à 6 semaines après application. Cloquintocet- mexyl améliore la tolérance des cultures céréalières au Clodinafop - propargyl.

Spectre d'activité :

BRUMBY 80 EC est efficace sur un grand nombre de graminées annuelles particulièrement :

- Folle avoine
- Phalaris
- Ray - Grass

Sélectivité :

BRUMBY 80 EC est sélectif des blés durs, blés tendres et triticales.

Il est strictement interdit d'appliquer le **BRUMBY 80 EC** sur les cultures d'orges & avoines.