

# سيليكترا 10 SC

مركز معلق م-م يحتوي 100 غ/لتر من مادة بروموكونازول علامة مسجلق سوميتومو .

**سيليكترا 10 SC** مبيد فطري جهازي ذو فعالية وقائية وعلاجية ضد البياض الزغبي للخضروات، القرعيات، الكروم والاشجار المثمرة و مرض تبقع أشجار التفاح والإجاص.

## خصائص المادة الفاعلة

**سيليكترا 10 SC** مبيد فطري جهازي يحتوي على مادة البروموكونازول من عائلة التريازول ذات فعالية وقائية وعلاجية على عدة فطريات خاصة منها الاسكوميسات (الاولديوم والتبقع) و حتى الفطريات الغير الكاملة (الترناريا و فوزاريوز).

**سيليكترا 10 SC** مركب اختياري يستعمل على عدة محاصيل سواء تحت البيوت البلاستيكية أو الحقلية.

يخترق **سيليكترا 10 SC** النبات ويقضي على المرض من مرحلة العدوى وفترة الانتشار في النسيج النباتي أي أثناء ظهور أعراض المرض.

## الاستعمالات المسموحة :

الزراعات	الأمراض	المقادير	المدة قبل جني الثمار
الخضروات العنب	البياض الزغبي	0,3 لتر / هكتار	7 أيام
			14 يوم
الاشجار المثمرة	التبقع	0,4 لتر / هكتار	14 يوم

لأفضل وقاية لمزروعاتكم، استعملوا **سيليكترا 10 SC** وقائياً أثناء توقع ظهور المرض.

- بعد الرش، تمتص الأوراق بسرعة فائضة وينتقل عبر النسج في ظرف 6 الى 8 ساعات وبذلك لا يكرر الرش في حالة تساقط الامطار.

يمكننا إعادة استعمال **سيليكترا 10 SC** كل 7 الى 14 يوم حسب اهمية ضغط الأمراض وانتشارها.

يستحسن عدم تجاوز 4 استعمالات لكل دورة نباتية للزراعات وذلك في اطار تجنب مقاومة البياض الدقيقي لعائلة التريازول.

## إمكانيات الخلط :

يمكن خلط **سيليكترا 10 SC** مع أغلبية المبيدات الفلاحية، ما عدا المواد القلوية. يجب تجريب كل خليط غير معروف قبل تعميم الاستعمال.



يجب قراءة الإرشادات المذكورة على الالاصقة قبل إستعمال المبيد و يجب إحترامها بدقة.

Bien lire l'étiquette avant d'utiliser le produit en respectant les consignes de sécurité.

**Distribué par :**  
Agro Consulting Algeria ACI  
194 Rue Boudjemaa Khellil  
Oued Romane El Achour  
Tél : 021 30 81 63 à 66  
Fax : 021 30 83 66



**Fourni par :**  
Rivale  
7-9 Rue Paul Lafarge - La Défense  
92800 - Puteaux - France  
+(33) 1 47 76 32 66  
+(33) 1 47 76 15 12  
Fax : +(33) 1 47 76 34 90  
Email : contact@rivale.fr



**Fabriqué par :**  
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE  
Parc d'affaire de cécyc  
69370 St Didier au Mont d'or  
France



**موزع من طرف :**  
أفرو كونسولتينج الدولية  
194، شارع بوجمة خليل  
وادي الزمان- العاشور- الجزائر  
الهاتف : 021 30 81 66-63  
الفاكس : 021 30 83 66

**ممول من طرف :**  
شركة ريفال  
7-9 شارع بول لافارج - لاديفنس  
92800 بوتو - فرنسا  
الهاتف : (+33) 1 47 76 32 66  
(+33) 1 47 76 32 66  
الفاكس : (+33) 1 47 76 34 90

**مصنوع من طرف :**  
سوميتومو شيميكال أفرو أوروبا  
حديقة الأعمال سوسبي  
سانت ديدني مون دور  
فرنسا



Face à la polyphagie de l'oidium, un produit polycultures qui agit de l'intérieur contre le champignon

مبيد فطري جهازي ذو فعالية وقائية وعلاجية ضد البياض الزغبي (اولديوم) للخضروات القرعيات العنب و الاشجار المثمرة و مرض تبقع اشجار التفاح و الاجاص

Fongicide systémique à action préventive et curative contre l'oidium des cultures légumières, des cucurbitacées, de la vigne et des arbres fruitiers, la tavelure du pommier et du poirier.



الطماطم



Tomate

الإجاص



Poire

العنب



Vigne

التفاح



Pomme

الفلفل



Poivron



Suspension concentrée ( SC ) contenant 100 g/l de bromuconazole.

### Marque déposée SUMITOMO

Fongicide systémique à action préventive et curative contre l'oïdium des cultures maraîchères, des cucurbitacées, de la vigne, des arbres fruitiers, la tavelure du pommier et du poirier.

### Caractéristiques de la matière active :

Le bromuconazole issu de la recherche de SUMITOMO est une triazole, fongicide systémique, inhibitrice de la biosynthèse de l'ergostérol et active sur de nombreux champignons pathogènes. Recommandations d'emploi de **Selectra 10 SC**

**Selectra 10 SC** est une formulation sélective qui permet son application sur un grand nombre de cultures conduites ,en serres ou en plein champ.

**Selectra 10 SC** , pénètre dans la feuille dans les 6 à 8 heures qui suivent son application et permet donc une protection rapide et efficace. Ainsi,pour une protection optimale de vos cultures,appliquez de préférence **Selectra 10 SC** de façon préventive en période de risque de maladie, en fonction des avertissements agricoles.

### Doses et usages homologués :

Cultures	Maladies	Doses	Délai avant récolte
Cultures maraîchères	OÏDIUM	0,3 L/ha	07 jours
			14 jours
Vigne			
Arbres fruitiers	TAVELURE	0,4 L/ha	14 jours

# Selectra 10 SC

سيليكترا

Face à la polyphagie de l'oïdium, un produit polycultures qui agit de l'intérieur contre le champignon



- Dans tous les cas , on pourra appliquer **Selectra 10 SC** à une cadence de 7 à 14 jours selon l'importance de la pression parasitaire. Dans le cadre de la prévention contre les résistances de l'oïdium , on veillera à ne pas cumuler les traitements à base de triazoles et donc de ne pas excéder 4 traitements par cycle de culture.

**Selectra 10 SC**, n'a pas d'effets organoleptiques sur les qualités des productions récoltées

### Compatibilité :

Selectra 10 SC est compatible avec la plu part des produits phytosanitaires excepté ceux à base de produits alcalins, il est préférable de procéder à un test préalable de compatibilité et de phytotoxicité avant tout mélange non connu avant de généraliser l'application .

### Préparation de la bouille :

Verser la quantité voulue de **Selectra 10 SC** dans la cuve du pulvérisateur à moitié remplie. Compléter le remplissage en maintenant l'agitation .

### Précautions d'emploi :

Conserver sous clé hors de la portée des enfants , à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux .

Stocker uniquement dans son emballage d'origine

Porter des vêtements de protection ( bottes,gants,lunettes ).

En cas de contact avec la peau se laver immédiatement à l'eau et au savon.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation .