

# سورغو هجين سودان غراس

## بذور أعلاف



### طريقة الاستغلال :

- عدم القطع أو الرعي حتى يصل إرتفاع النبتة 45 سم
- قطع ما بين 60 و 90 سم للحصول على أجود و أفضل مردود.
- قطع ما بين 15 و 20 سم على مستوى الأرض لإعادة نمو سريع.

### إرتفاع الحصاد:

- للمراعي من 45 الى 60 سم
- للعلف الأخضر و للقش من 60 الى 90 سم

### المردود :

- القطع من 2 إلى 4 مرات إبتداء من تاريخ البذر.
- في 4000 م<sup>2</sup> : من 3 إلى 6 طن من المادة الجافة أي 20 إلى 40 طن من المادة الخضراء.



Cultiver l'avenir

أقرو كونسيلتينج الدولية  
194، شارع بوجمعة خليل واد الرمان- العاشور- الجزائر  
الهاتف : 021 30 81 66-63 / الفاكس : 021 30 83 66  
E-mail : info@aci-algerie.com/site web : www.aci-algerie.com

### الخصوصيات التقنية:

- إستعمال مضمون للعلف الصيفي
- مناسب للتبن و القش
- يمكن إستعماله للمراعي
- مردود جيد في الاوراق و السيقان
- جيد للتربة القاعدية (غير حمضية)

### القيمة الزراعية :

- إمكانات إنتاجية العلف : 3
- النضج المبكر : 2
- النمو : 2
- الإرتفاع المتوسط للنبتة : 6-7 (180-210 سم)
- عديم الإنبطاح (مقاومة السقوط على الأرض في حال الرياح القوية) : 4
- تحمل الجفاف : 3
- كتلة نباتية : 3

### الاستعمالات الأساسية :

- القطع : 3
  - الرعي : 4
  - القش : 3
  - التبن : 3
- \* التقييم الرقمي 1 إلى 9 ( 1 = ممتاز ؛ 9 = ضعيف)

### طريقة الزرع :

- تاريخ الزرع : من نهاية افريل إلى منتصف اوت. درجة حرارة التربة يجب ان تكون ما بين 15° إلى 18° . الزراعة المبكرة يمكن ان تسبب نمو بطيئ و نقص في الإرتفاع.
- العمق : من 2 الى 3 سم على حسب رطوبة التربة.
- الكمية المستعملة في الزرع : من 25 الى 30 كغ/هكتار
- التباعد بين الاحواض : من 20 الى 30 سم



# SORGHO HYBRIDE SUDANGRASS

## SEMENCES FOURRAGÈRES

### Caractéristiques techniques :

- Très fiable pour les fourrages d'été
- Idéal pour le foin et ensilage
- Peut être utilisé en pâturage
- Très bon rapport feuillage / tige
- Bon pour les sols alcalins (tolérant au sel)

### Valeurs agronomiques :

- Potentiel de rendement fourrage : 3
- Précocité : 2
- Repousse : 2
- Hauteur moyenne de la plante (pieds) : 6 – 7 (180 à 210 cm)
- Résistant à la verse : 4
- Tolérance à la sécheresse : 3
- Masse végétative : 3

### Principales utilisations :

- Coupes : 3
- Pâturage : 4
- Ensilage : 3
- Foins : 3

\* Evaluation numérique 1 à 9 (1= excellent ; 9 = mauvais)

### Mode de semis :

- Date de semis : Fin Avril à la mi- Août. La température du sol doit être entre 15 ° et 18 ° C. Les semis précoces peuvent causer une croissance lente et un manque de levée.
- Profondeur : 2 à 3 cm en fonction de l'humidité du sol.
- Dose de semis : 25 à 30 kg/ ha.
- Ecartement : entre ligne 20 à 30 cm.



### Mode d'exploitation :

- Ne pas couper ou faire paître jusqu'à ce que le fourrage atteigne 45 cm de hauteur.
- Couper entre 60 et 90 cm pour une meilleure qualité et rendement.
- Couper 15 à 20 cm au dessus du niveau du sol pour une repousse rapide.

### Hauteur de récolte :

- Pâturage : 45 à 60 cm
- Fourrage en vert et Ensilage : 60 à 90 cm

### Rendement :

- 2 à 4 coupes en fonction de la date de semis.
- Pour 4000 m<sup>2</sup> : 3 à 6 tonnes de matière sèche, soit 20 à 40 tonnes de poids vif.



*Cultiver l'avenir*

Agro Consulting International (ACI)  
194, Rue Boudjemâa Khelil Oued Romane El Achour 16403.  
Tel : 021.30.02.08/ 30.81.63 à 66  
E-mail : info@aci-algerie.com/site web : www.aci-algerie.com