

APOACARICIDE

أبوأكاريسيد

Acaricide

مبيد ضد القارديات



يحتوي على 500 غ /ل من مادة
كلوفنتيزين على شكل مركز معلق

Contient 500 g/L de CLOFENTEZINE
sous forme de Suspension Concentrée (SC)



Fourni par:
Rivale : 7 - 9 Rue Paul Lafargue
92800 Puteaux -France
Tél. : +33 (0)1 47 76 32 66
Fax : +33 (0)1 47 76 34 90
Mail : contact@rivale.fr
Web : www.rivale.fr



عنوان الممول :
شركة ريفال :
9 - 7 شارع بول لافارق 92800 بوتو - لا ديفانس - فرنسا



Cultiver l'avenir

Importé et distribué par :
SARL Agro Consulting International
194 Rue Boudjemâa Khelil
Oued Romane CP 16403
El Achour. Alger
Tél : +213 (0) 23 31 69 42 à 49
Fax : +213 (0) 23 31 69 50

مستورد و موزع من طرف :
ش.ذ.م.م أقرو كونسولتينج الدولية
194 شارع بوجمعة خليل،
واد الرمان 16403 العاشور، الجزائر

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

| CATEGORIE D'UTILISATION | DOSE EN P.C | D.A.R. |
|---|-------------|----------|
| ACARIENS sur Agrumes & Arbres fruitiers | 0,4 L/Ha | 45 jours |

APOACARICIDE (Clofentézine) est un acaricide, unique représentant de la famille des tétrazines. Il agit par contact sur les oeufs et les premiers stades larvaires de nombreux acariens, essentiellement ceux des genres *Tetranychus* et *Panonychus*. Bien qu'il ne soit pas efficace sur adulte, il perturbe la ponte des femelles et diminue la viabilité des oeufs dans les jours suivant l'exposition.

Sa persistance d'action est de l'ordre de 2 mois. Il possède une activité translaminaire importante.

APOACARICIDE s'applique seul en début de saison (stade oeuf) et en mélange avec un adulticide durant le reste de la saison.

COMPOSITION :

APOACARICIDE est une suspension concentrée contenant 500 g de clofentézine/litre.

MODE D'ACTION

APOACARICIDE inhibe le développement de l'embryon en agissant au niveau du système respiratoire. Peu d'acaricides possèdent ce mode d'action, ce qui en fait un bon outil de prévention/gestion de la résistance.

COMPATIBILITÉ :

APOACARICIDE est compatible avec de nombreux acaricides. Cependant, il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité pour tout nouveau mélange avant de l'appliquer à grande échelle.

PRÉVENTION OU GESTION DE LA RÉSISTANCE :

Afin que l'**APOACARICIDE** reste efficace le plus longtemps possible, il est nécessaire de l'alterner avec des acaricides ayant un mode d'action différent.

AUTRES UTILISATIONS :

| CATEGORIE D'UTILISATION | DOSE EN P.C | D.A.R. |
|-------------------------|-------------|----------|
| ACARIENS sur Tomate | 40 cc/hl | 03 jours |
| ACARIENS sur Melon | 40 cc/hl | 03 jours |
| ACARIENS sur Pastèque | 40 cc/hl | 07 jours |
| ACARIENS sur Fraisier | 40 cc/hl | 03 jours |
| ACARIENS sur Vigne | 40 cc/hl | |



الجرعة و الإستعمالات المسموحة :

| فترة ما قبل الجني | الجرعة | فئة الإستعمال |
|-------------------|-------------|------------------------------------|
| 45 يوم | 0.4 ل/هكتار | قراديات الحمضيات و الأشجار المثمرة |

أبوأكاريسيد (كلوفينتينزين) هو مبيد مضاد للقراديات ، وهو ممثل فريد لعائلة التترازين. يعمل عن طريق الملامسة مع البيض والمرحلة اليرقية الأولى للعديد من القراديات ، وخاصة تلك التي تنتمي إلى أجناس **تيترايانشوس** و **بانونيشوس**. على الرغم من عدم فعاليته عند البالغين ، إلا أنه يعطل وضع البيض عند الإناث ويقلل من قابلية بقاء البيض في الأيام التالية للتعرض. استمرار فعاليته تدوم شهرين، له نشاط انتقائي كبير .

يطبق مبيد **أبوأكاريسيد** بمفرده في بداية الموسم (مرحلة البيض) ويخلط مع مبيد للبالغين خلال الفترة المتبقية من الموسم.

التركيبة

أبوأكاريسيد هو عبارة عن مركز معلق يحتوي على 500 غ/ل من مادة كلوفينتينزين.

طريقة التأثير :

يثبط مبيد **أبوأكاريسيد** نمو الجنين من خلال العمل على الجهاز التنفسي. قليل من مبيدات القراديات لديها هذا النمط من العمل ، مما يجعلها أداة جيدة لمنع / إدارة المقاومة.

إمكانية الخطأ :

مبيد **أبوأكاريسيد** متوافق مع العديد من مبيدات القراديات، ومع ذلك ، يوصى بإجراء اختبار توافق لأي خليط جديد قبل تطبيقه على نطاق واسع.

منع أو إدارة المقاومة:

لكي يظل مبيد **أبوأكاريسيد** فعالاً لأطول فترة ممكنة ، يجب أن يتناوب مع مبيدات القراديات التي لها طريقة عمل مختلفة.

إستعمالات أخرى :

| فترة ما قبل الجني | الجرعة | فئة الإستعمال |
|-------------------|------------|------------------|
| 03 أيام | 40 ملل/هـل | قراديات الطماطم |
| 03 أيام | 40 ملل/هـل | قراديات البطيخ |
| 07 أيام | 40 ملل/هـل | قراديات الدلاع |
| 03 أيام | 40 ملل/هـل | قراديات الفراولة |
| | 40 ملل/هـل | قراديات العنب |