

BOCUS

بوكوس

**Fongicide anti-botrytis
à actions préventive et curative**

مبيد فطري مضاد للبوتريتيس
ذو فعالية وقائية و علاجية



**CONTIENT 50 % DE BOSCALID SOUS FORME DE
GRANULÉS DISPERSIBLES DANS L'EAU (WG)**

يحتوي على 50 % من مادة بوسكاليد على شكل حبيبات قابل
للذوبان في الماء



Fourni par :
RIVALE INTERNATIONAL
PO Box 111- Sechelt BC V0N3A0
CANADA
Tel: +1604-916-2569
Email: info@rivaleinternational.com

مصدر من طرف : ريفال انترناسيونال
بو بوكس 111 - سيشلت ب.س فون 03 كندا

Importé et distribué par :
SARL Agro Consulting International

194 Rue Boudjemâa Khelil
Oued Romane CP 16403
El Achour. Alger

Tél : +213 (0) 23 31 69 42 à 49
Fax : +213 (0) 23 31 69 50

مستورد و موزع من طرف :
ش.ذ.م.م أقرو كونسولتينج الدولية
194 شارع بوجمعة خليل،
واد الرمان 16403 العاشور، الجزائر

Propriétés

BOCUS est un fongicide de contact et trans-laminaire. Pour qu'il exprime toutes ses qualités, il sera utilisé de préférence en préventif.

Pour une bonne gestion des modes d'action fongicide, il est recommandé d'appliquer **BOCUS** ou tout produit de la famille des carboxamides une seule fois par saison.

Recommandations d'emploi

Afin de réduire les risques éventuels d'apparition de souches de pourriture grise résistantes, **BOCUS** s'applique une seule fois par saison, à l'une des périodes suivantes :

-Fin floraison - chute des capuchons floraux, afin de contrôler les infections précoces de pourriture grise latente (contamination des jeunes baies via les blessures d'abscission des pièces florales) et de réduire l'inoculum disponible à la véraison,

-Début de la fermeture des grappes, afin d'empêcher le développement du champignon à l'intérieur de celles-ci, notamment lorsque les blessures de la cuticule occasionnées par les tordeuses de la grappe ou les maladies en favorisent l'installation,

-Véraison, afin d'éviter la pénétration de la pourriture grise dans les baies.

Dans tous les cas, localiser la pulvérisation du produit sur la zone des grappes, en traitant le rang face par face.

Cultures	Maladie	Doses	D.A.R.
Vigne	Botrytis	1.2 Kg/ha	21 jours
Tomate	(Pourriture grise)	1 Kg/ha	

Compatibilité :

BOCUS est normalement compatible avec de nombreux produits couramment utilisés. Éviter les mélanges avec les produits alcalins, il faut faire un test de compatibilité avant de procéder au mélange.

Remarques :

BOCUS est neutre vis-à-vis de la faune auxiliaire.

الخواص

بوكوس مبيد فطري يعمل باللمس و التنقل. لفعالية مثالية، يستحسن استخدامه كإجراء وقائي.

من أجل الإدارة الجيدة لطرق عمل مبيدات الفطريات، يوصى باستخدام **بوكوس** أو أي منتج من عائلة الكربوكساميد مرة واحدة فقط في الموسم.

مقادير و طرق الإستعمال

يتم استخدام **بوكوس** كجزء من برنامج مكافحة التعفن الرمادي ليتم تكييفه مع الظروف الزراعية والإقليمية.

من أجل تقليل المخاطر المحتملة لظهور سلالات مقاومة من العفن الرمادي، يتم تطبيق **بوكوس** مرة واحدة فقط في الموسم، في إحدى الفترات التالية:

- نهاية الإزهار - سقوط قيعات الأزهار, من أجل السيطرة على العدوى المبكرة للعفن الرمادي الكامن (تلوث التوت الصغير عن طريق جروح قطع أجزاء الأزهار) ولتقليل اللقاح المتاح في مرحلة الإرقاق.

- بدء إغلاق عناقيد العنب, من أجل منع تطور الفطريات بداخلها، خاصة عندما تكون إصابات البشرة الناتجة عن عثة العنب أو الأمراض التي تساعد على تكوينها.

-مرحلة الإرقاق (الإلماص), في وقت مبكر حسب نوع العنب، وذلك لتجنب تغفل العفن الرمادي في العنب. في جميع الحالات، قم بوضع رش المنتج على منطقة العنقود، مع معالجة صف بصف.

المحصول	المرض	الجرعة	فترة ما قبل الجني
العنب	بوتريتيس	1.2 كغ / هكتار	21 يوم
الطماطم	(التعفن الرمادي)	1 كغ / هكتار	

إمكانية الخلط :

يمكن مزج **بوكوس** مع أغلبية المبيدات الفلاحية و الأسمدة الورقية.

ننصح بعدم استعماله مع المبيدات القلوية لكن يستحسن القيام باختبار قبل تعميم الإستعمال.

ملاحظة :

بوكوس لا يضر الكائنات النافعة.

