

CYRPA 25EC

سيربا EC 25

**INSECTICIDE NON-SYSTEMIQUE
AGIT PAR CONTACT ET INGESTION**

مبيد حشري غير جهازى يعمل
عن طريق الملامسة و الهضم



يحتوي على 250 غ / ل من مادة السبيرميثرين على شكل مستحلب مركز

**Contient 250 g/L de CYPERMETHRINE sous forme de
Concentré émulsionnable (EC)**

GAIA
UNITED



Cultiver l'avenir

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

CATEGORIE D'UTILISATION	DOSES	D.A.R.	OBSERVATIONS
ALEURODES / NOCTUELLES Des cultures maraichères sous serre	12 – 20 ml/hl	07 jours	Toxique pour les abeilles.
PUCERONS /PSYLLE Des arbres fruitiers	10 ml/hl	14 jours	Eviter le traitement en période de floraison.
TEIGNE de la pomme de terre	12 ml/ha	14 jours	

CARACTERISTIQUES

Cyrpa 25 EC est un insecticide de la famille des pyrèthrinoides de synthèse agissant par contact et ingestion a très faible dose sur un grand nombre d'insectes particulièrement les larves de lépidoptères les coléoptères et les piqueurs suceurs.

-Utilisé dans l'éradication de beaucoup d'insectes comme la mite, le ver de coton, le ver de grain, le ver de chou, les pucerons, Altherbs, mouche blanche, les trémies et d'autres. Peut aussi être utilisé pour contrôler beaucoup d'insectes dans les serres, les bâtiments industriels, les granges, les magasins, les laboratoires, les bâtiments et d'autre à grande échelle.
-Utilisé sur les récoltes suivantes comme le riz, le tabac, le thé, les légumes, le coton, les arbres fruitiers, L'agrumes les récoltes de céréale et d'autre.

TOXICITE :

Toxique aux abeilles et aux poissons. Toxique par l'inhalation et l'ingestion.

COMPATIBILITE :

Cyrpa 25 EC est compatible avec la plupart des produits phytosanitaires à l'exception des bouillies alcalines (**BOUILLIE BORDELAISE, SULFOCALCIQUE**). Il est néanmoins préférable de procéder à un test avant de généraliser le traitement.

REMARQUES

- Dans le cas de traitement contre les aleurodes des serres, alterner avec insecticides appartenant à des familles chimiques différentes.
- Ne pas appliquer en présence d'abeilles.
-La cyperméthrine à une très faible solubilité dans l'eau, elle résiste donc très bien au lessivage. Ceci confère à **Cyrpa 25 EC** une bonne persistance d'action d'environ 2 à 3 semaines.
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec des traitements préventifs, précoces ou en début de végétation. (Avant que les insectes ne soient cachés par une végétation trop abondante).
Il est donc conseillé d'appliquer **Cyrpa 25 EC** juste avant ou au moment de l'éclosion des œufs, ou sur les premiers stades larvaires.

الجرعة و الإستعمالات المسموحة :

الملاحظات	فترة ما قبل الجني	الجرعة	فئة الإستعمال
-سام للنحل	7 أيام	20 - 12 مل/هـل	الذبابة البيضاء و الفراشة اليبيلة على الخضروات في البيوت البلاستيكية
-تجنب الرش في فترة الإزهار	14 يوم	10 مل/هـل	المن، البسيلة على الأشجار المثمرة
	14 يوم	12 مل /هـل	عثة درنات البطاطا

المميزات

-سيربا 25 EC مبيد الحشرات من عائلة البيريثرينويد ذات فعالية قوية عن طريق الملامسة و الجهاز الهضمي بمقادير صغيرة جدا على عدد كبير من الحشرات وخاصة يرقات الحشرات .

-يستخدم في القضاء على العديد من الديدان القارضة والحشرات الناقبة للأوراق والثمار والسيقان مثل عثة القطن، دودة القطن، دودة الذرة، دودة الملفوف، المن، الثrips، الذبابة البيضاء ، النطاطات وغيرها . كما يمكن أن يستخدم لمكافحة العديد من الحشرات في البيوت البلاستيكية، في المباني الصناعية، الحظائر، المخازن، المختبرات، المباني وغيرها على نطاق واسع.

- تستخدم على المحاصيل التالية مثل الأرز، التبغ، الشاي، الخضراوات، القطن، الأشجار المثمرة، الحمضيات، حبوب المحاصيل، وغيرها.

درجة السمية

مبيد حشري زراعي سام للنحل والأسماك. مبيد حشري زراعي سام إذا استنشق أو بلع .

إمكانيات الخط:

يمكن خط **سيربا 25 EC** مع أغلبية المبيدات الزراعية ما عدا السوائل (مثل سائل بوردو.....). يجب تجربة أي خليط غير معروف قبل تعميم الإستعمال .

نصائح الإستعمال :

-من خصائص **السيبيرميثرين** ان لديه قابلية ضعيفة جدا للذوبان في الماء ولذلك فإنه يقاوم بشكل جيد جدا لعملية الغسيل مما يعطي تأثير فعال لمدة تستمر من 2-3 اسابيع . للحصول على أفضل النتائج، يجب استعمال **سيربا 25 EC** بطريقة وقائية قبل خروج اليرقات من البيض أو عند خروجها .

-لمكافحة الذبابة البيضاء داخل البيوت البلاستيكية يفضل استعمال **سيربا 25 EC** بالتناوب مع مبيد آخر من عائلة اخرى .
-يمنع إستعمال **سيربا 25 EC** عند وجود النحل في الحقول .

