

EFFICAZ 20 SC

إفيكاز 20 SC

مبيد حشري بتأثير بالملامسة والهضم
**Insecticide de contact
et ingestion**



يحتوي على 200 غ / ل من مادة الكلورانترانيبيروول على شكل مركز معلق
**CONTIENT 200 G/L DE CHLORANTRANILIPROLE,
SOUS FORME SUSPENSION CONCENTRÉE (SC)**

www.aci-algerie.com



Cultiver l'avenir

DOSES ET USAGES HOMOLOGUÉS :

UTILISATIONS	DOSES	D.A.R.
PYRALE/ALTISE/CICADELLE/TORDEUSE		
• VIGNE	0.175 L/ha	30 Jours
• ARBRES FRUITIERS	0.175 L/ha	14 Jours
NOCTUELLES/MINEUSE		
• CULTURES MARAICHERES	0.35 L/ha	14 Jours

EFFICAZ 20 SC est un insecticide à large spectre de choix en matière de la protection des cultures qui fournit une maîtrise de longue durée des insectes nuisibles en particulier les lépidoptères sur les stades Larvaires et Oeufs.

EFFICAZ 20 SC appartient à la classe chimique des diamides anthraniliques et fait partie du Groupe 28 Insecticides (Activateurs des récepteurs à ryanodine) selon le schéma de classification des modes d'action de l'IRAC. L'utilisation répétée et exclusive de **EFFICAZ 20 SC** ou tout autre produit du Groupe 28 Insecticides peut conduire au développement de souches résistantes d'insectes sur certaines cultures. Les stratégies suivantes sont recommandées afin de prévenir l'apparition de forme de résistance :

- Alternier avec des insecticides à mode d'action différent.
- Surveiller les populations d'insectes et appliquer quand les seuils économiques localement identifiés sont atteints, en suivant les avis des Stations d'Avertissement Agricoles.
- Suivre précisément les recommandations mentionnées sur l'étiquette pour les dosages, les intervalles de traitements, le nombre d'applications ainsi que les périodes d'applications.

Pour minimiser le risque de résistance, le nombre de traitements avec le **EFFICAZ 20 SC** est limité à 2 fois par saison sur grandes cultures et maximum 4 applications / récolte sur cultures protégées. Avec un volume d'eau maximal de 1500 L / ha. Veiller à ne pas dépasser 50 % du total des traitements insecticides en utilisant les produits appartenant au Groupe 28.

COMPATIBILITE :

EFFICAZ 20 SC est compatible avec les pesticides les plus largement utilisés, il est préférable d'avoir un test à petite échelle avant le mélange et l'application.

Conseils d'utilisation

Pour un contrôle efficace des insectes, plus d'une application peut être nécessaire de 10 à 14 jours d'intervalle. Suivre les recommandations d'utilisation selon les instructions données dans l'étiquette en respectant les doses d'emploi.

الجرعة و الإستعمالات المسموحة :

الإستعمالات	الجرعات	فترة ما قبل الجني
الحفار / خنفساء البراغيث نطاطات الأوراق / الدودة اللفافة • الكروم (العنب) • الأشجار المثمرة	0.175 ل/هكتار 0.175 ل/هكتار	30 يوم 14 يوم
الفراش الليلي (النوكتويل) / الحفارات • الخضروات	0.35 ل/هكتار	14 يوم

يعدّ **إفيكاز 20 SC** مبيدا حشرياً مفضلاً في مجال حماية المحاصيل، حيث يوفر مكافحة طويلة الأمد وواسعة الطيف للحشرات الضارة، ولا سيما حرشفيات الأجنحة (الليبيدوبتيرا) في مرحلة اليرقات والبيض.

ينتمي **إفيكاز 20 SC** إلى الفئة الكيميائية الدياميد الأنثرايني، وهو جزء من المجموعة 28 من مبيدات الحشرات (منشطات مستقبلات الريانودين)، وذلك وفقاً لمخطط تصنيف أنماط التأثير الصادر عن IRAC. إن الاستعمال المتكرر والحصري لـ **إفيكاز 20 SC** أو لأي منتج آخر من مبيدات الحشرات التابعة للمجموعة 28 قد يؤدي إلى تطور سلالات مقاومة من الحشرات على بعض المحاصيل. وللوقاية من ظهور المقاومة، يُوصى باتباع الاستراتيجيات التالية:

- التناوب مع مبيدات حشرية ذات آلية تأثير مختلفة.
- مراقبة تجمعات الحشرات والتدخل عند بلوغ العتبات الاقتصادية المحددة محلياً، مع الالتزام بتوصيات محطات الإنذار الزراعي.
- الالتزام بدقة بالتوصيات المذكورة على ملصق المنتج فيما يخص الجرعات، وفترات المعاملة، وعدد التطبيقات، وكذلك مواعيد التطبيق.

ولتقليل خطر المقاومة، يقتصر عدد المعاملات بمبيد **إفيكاز 20 SC** على مرتين في الموسم في المحاصيل الحقلية، وبحد أقصى أربع تطبيقات لكل حصاد في المحاصيل المحمية، مع حجم ماء أقصى قدره 1500 لتر/هكتار. ويجب الحرص على ألا تتجاوز المعاملات باستخدام منتجات المجموعة 28 نسبة 50% من إجمالي المعاملات بالمبيدات الحشرية.

إمكانات الخلط:

يمكن خلط **إفيكاز 20 SC** مع مدى واسع من المبيدات الحشرية و الفطرية المستخدمة على جميع المحاصيل المذكورة في الجدول السابق، و يفضل عمل تجربة قبل القيام بالخلط.

إرشادات الاستعمال

للحصول على مكافحة فعالة للحشرات، قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من تطبيق واحد بفواصل زمنية يتراوح بين 10 و14 يوماً. يجب اتباع توصيات الاستعمال وفقاً للتعليمات الواردة على ملصق المنتج مع الالتزام بالجرعات الموصى بها.

